

# Beipackzettel zum Medikament Super Filagra®

Hersteller von Super Filagra® Tabletten: Dadha Pharma Pvt. Ltd., Indien

Vertrieb der Original Super Filagra® Tabletten im Internet: [www.pillenpeter.com](http://www.pillenpeter.com)

## Arzneilicher Wirkstoffstoff einer Super Filagra® Tablette:

100mg Sildenafil Citrat; 1-[[3-(1-Methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazin und 60mg Dapoxetin; (S)-N,N-Dimethyl-1-phenyl-3-(1-naphthyl-1-oxo)propylamin

## Wie wirkt der Inhaltsstoff Super Filagra® Tabletten?

Super Filagra® enthält die Wirkstoffe Sildenafil und Dapoxetin in einer Wirkstoffmenge von 100mg Sildenafil und 60mg Dapoxetin in einer Tablette. Sildenafil wird zur Behandlung von Impotenz (erektile Dysfunktion) eingesetzt und dient dazu Erektionsstörungen zu verringern. Dapoxetin ist der erste Wirkstoff, der für die Behandlung des frühzeitigen Samenergusses (Ejaculatio praecox) des Mannes entwickelt wurde. Die Pharmakokinetik von Sildenafil (100 mg) in Kombination mit Dapoxetin (60 mg) wurde in einer Einzeldosis-Cross-over-Studie untersucht. Sildenafil führte zu leichten Veränderungen in der Pharmakokinetik von Dapoxetin (22%iger Anstieg der AUC<sub>inf</sub> und 4%iger Anstieg der C<sub>max</sub>), wobei man nicht davon ausgeht, dass diese klinisch bedeutsam sind. Man sollte jedoch auf Grund der möglicherweise reduzierten othostatischen Toleranz mit sehr grosser Vorsicht an den Gebrauch von Super Filagra® Tabletten herangehen! Nur ein sehr genaues ärztliches Abwägen von allen Faktoren (insbesondere Ihre individuellen Lebensgewohnheiten), einer Behandlung mit Super Filagra®, wird Ihnen einen Behandlungserfolg ermöglichen. Super Filagra® Tabletten sollte auf keinem Fall in Verbindung mit Alkohol, Drogen (jeglicher Art), Kaffee und nitrathaltigen Medikamenten eingenommen werden!

**Anwendungsgebiete: Erektile Dysfunktion (Impotenz) bei gleichzeitiger Behandlung des frühzeitigen Samenergusses (Ejaculatio praecox)**

## Warnhinweise – Gegenanzeigen – Nebenwirkungen. Was Sie unbedingt beachten sollten!

### Wann darf Super Filagra® nicht verwendet werden?

Super Filagra® darf nicht angewendet werden bei

- \* Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe
- \* gleichzeitiger Einnahme von Alpha-Sympatholytika oder gefässerweiternden Mitteln auf Nitro-Basis (Nitraten), da es hier zu einem starken Blutdruckabfall kommen kann
- \* gleichzeitiger Einnahme von Wirkstoffen wie den Pilzmitteln Ketoconazol und Itraconazol sowie dem Anti-Vitus-Mittel Ritonavir. Sie können Wirkung und Nebenwirkungen von Sildenafil verstärken.
- \* schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie instabiler Angina Pectoris oder schwerer Herzmuskelschwäche, nach einem Schlaganfall, der weniger als sechs Monate zurückliegt, oder innerhalb der ersten drei Monate nach einem Herzinfarkt
- \* schwerem Lungenhochdruck (Klasse IV)
- \* mässige bis schwere Nieren- oder Leberfunktionsstörungen
- \* niedrigem Blutdruck mit einem Systolenwert unter 90 mmHg
- \* erblicher Erkrankung der Augennetzhaut (Retinitis pigmentosa) oder mit Schädigung des Sehnervs aufgrund einer Durchblutungsstörung.
- \* Herzerkrankungen (Herzinsuffizienz (Herzschwäche)), Reizleitungsstörungen (AV-Block zweiten oder dritten Grades oder Sick-Sinus-Syndrom), Ischämie (Sauerstoffmangel, wie er z. B. bei der KHK auftritt) des Herzens, Herzklappenerkrankungen).
- \* Therapie mit einem MAO-Hemmer (oder Einnahme innerhalb der letzten 14 Tage). Monoaminoxidase-Hemmer sind Medikamente die zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden.
- \* Therapie (oder Einnahme innerhalb der letzten 14 Tage) mit Thioridazin. Thioridazin gehört zur Gruppe der Psychopharmaka und wirkt als Neuroleptikum.
- \* Gleichzeitige (oder innerhalb der letzten 14 Tage) Behandlung mit: Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI), Serotonin Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmern (SNRI), trizyklische Antidepressiva (TCA) und andere Arzneimittel/Pflanzenwirkstoffe mit serotoninerger (serotoninverstärkender) Wirkung (z. B. L-Tryptophan, Triptane, Tramadol, Linezolid, Lithium, Johanniskraut).
- \* Begleittherapie mit hochwirksamen Enzymhemmern (CYP3A4-Inhibitoren), wie Ketoconazol, Itraconazol, Ritonavir, Saquinavir, Telithromycin, Nefazodon, Nelfinavir, Atazanavir.

© [www.pillenpeter.com](http://www.pillenpeter.com) – Packungsbeilage zum Download Seite 1

**Bitte lesen Sie auch die folgenden Seiten!**

# Beipackzettel zum Medikament Super Filagra®

**Nur nach sorgfältiger ärztlicher Nutzen-Risiko-Abwägung darf der Wirkstoff eingenommen werden bei**

- \* schweren arteriellen Durchblutungsstörungen, insbesondere bei einer Verengung im Bereich der Hauptschlagader (Aortenstenose)
- \* einer Störung der Blutdruckkontrolle (Multisystematrophie)
- \* Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
- \* Störungen der Blutgerinnung, Sichelzellenanämie oder bestimmten Formen von Blutkrebs (zum Beispiel Leukämie, Plasmozytom)
- \* Missbildungen des Penis
- \* bereits aufgetretenen schmerzhaften Dauererektionen (Priapismus)
- \* Nierenschwäche oder Leberfunktionsstörungen (zum Beispiel Leberzirrhose). Hier wird eine Verringerung der Sildenafil-Dosis durch den Arzt empfohlen.

## Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen für Super Filagra® Tabletten

- \* Die Einnahme des Medikaments bewirkt u.U. vorübergehend einen leichten Blutdruckabfall.
- \* Möglicherweise besteht im Zusammenhang mit sexueller Aktivität bei Einnahme des Medikaments ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und andere, zum Teil lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Störungen.
- \* In einigen Fällen trat eine unumkehrbare Schädigung des Sehnervs (nichtarterielle anteriore ischämische Optikusneuropathie, NAION) auf. Ob ein Zusammenhang mit der Einnahme des Medikaments besteht, ist nicht bekannt. Bei Verschlechterung des Sehvermögens ist unverzüglich ein Augenarzt aufzusuchen.
- \* Die Anwendung des Medikaments sollte nicht mit anderen Behandlungsmethoden für Erektionsstörungen (Prostaglandine) kombiniert werden.
- \* Das Medikament sollte nicht mit Grapefruitsaft eingenommen werden, da die Kombination zu einem starken Blutdruckabfall führen kann.
- \* Nehmen Patienten für einen Geschlechtsverkehr das Medikament, sollten sie während des Geschlechtsverkehrs oder danach bei Herzschmerzen keine Nitrate anwenden. Ihre Kombination mit dem Medikament kann zu schwerem Blutdruckabfall führen.
- \* Das Medikament darf zur Behandlung des Lungenbluthochdrucks nur unter ärztlicher Überwachung zusammen mit anderen Prostaglandinen eingesetzt werden.
- \* Das Medikament kann Schwindelgefühl und Sehstörungen hervorrufen und somit das Reaktionsvermögen beeinträchtigen.
- \* Das Reaktionsvermögen kann durch das Medikament so weit verändert sein, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Strassenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Masse im Zusammenwirken mit Alkohol. Auf Alkohol sollten Sie bei einer Therapie mit Super Filagra® unbedingt verzichten!

Manchmal lösen arzneiliche Wirkstoffe allergische Reaktionen aus. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion wahrnehmen, so informieren Sie einen Arzt. Bei dem aussergewöhnlichen Umstand eines anaphylaktischen Schocks, begeben Sie sich bitte in unverzügliche notärztliche Obhut!

## Welche Nebenwirkungen kann Super Filagra® haben?

Im Folgenden erfahren Sie das Wichtigste zu möglichen, bekannten Nebenwirkungen von Super Filagra®. Diese Nebenwirkungen müssen nicht auftreten, können aber. Denn jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Medikamente.

In dieser Aufstellung sind alle Nebenwirkungen zusammengefasst, welche bei der Anwendung von Super Filagra® sowohl gegen Erektionsstörungen und dem vorzeitigen Samenerguss, wie auch gegen Lungenbluthochdruck auftraten. Dadurch kann es in Einzelfällen Doppelungen bei den Häufigkeitsangaben geben.

Sehr häufige Nebenwirkungen:

Kopfschmerzen, Hitzegefühl und Rötung des Oberkörpers (Flush), Durchfall, Verdauungsstörungen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Versagen des Halteonus (Sturzgefahr), Schlaflosigkeit und Müdigkeit.

Häufige Nebenwirkungen:

Schwindel, erhöhte Lichtempfindlichkeit der Augen, unscharfes Sehen, Veränderungen des Farbsehens (auch Blausehen), Netzhautblutungen, Doppelbilder, anormales Gefühl im Auge, Augenreizungen, Herzklopfen, verstopfte Nase, Schnupfen und Nasennebenhöhlenentzündung, Nasenbluten, Grippe, Bronchitis, Husten, Blutarmut, Wasseransammlung im Gewebe, Schlaflosigkeit, Angst, Migräne, Zittern, nervliche Missempfindungen, Gefühl des Brennens, Empfindungsstörungen, Magenschleimhautentzündung, Magen-Darm-Entzündung, Sodbrennen, Verdauungsbeschwerden, Bauchspannen, Hämorrhoiden, Cellulitis, Hautrötung, Haarausfall, Muskelschmerzen, Brustschwellung, Fieber, Gewichtszunahme.

# Beipackzettel zum Medikament Super Filagra®

Gelegentliche oder seltene Nebenwirkungen:

Überempfindlichkeitsreaktionen, Augenschmerzen, Augenrötung, blutunterlaufene Augen, Hörstörungen, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Beschwerden- verursachende Angina pectoris, plötzlicher Herztod, niedriger Blutdruck, Bluthochdruck, Nasenbluten, Bewusstseinsverlust, Gehirngefäß-Blutungen, vorübergehende Durchblutungsstörungen des Gehirns, Erbrechen, Hautausschlag, Erektionsverlängerung, schmerzhaftere Erektion.

Nebenwirkungen ohne Häufigkeitsangabe: Hautausschlag.

## Anwendung und Dosierung:

Erwachsene: Einnahme etwa eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr mit ausreichend Flüssigkeit (kein Alkohol!), eine Super Filagra® Tablette. Die Einnahme von einer Super Filagra® Tablette innerhalb von 24 Stunden darf auf keinen Fall überschritten werden!

Schwangere, Kinder, Jugendliche; nervenkrankte, ältere und gebrechliche Patienten: Eine Therapie mit Super Filagra® Tabletten **darf bei diesem Patientenkreis auf keinen Fall erfolgen!**

## Wichtige Hinweise für Ihre günstigen Super Filagra® Tabletten ohne Rezept

Wir möchten, dass Sie glücklich leben können! Bitte beachten Sie, dass Sie Super Filagra® Tabletten problemlos, ohne Rezept bei einkaufen können. Die Lieferung erfolgt auf Originalbliester (ein Bliester enthält vier Super Filagra® Tabletten, eine Tablette enthält 100mg Sildenafilcitrat und 60mg Dapoxetin als pharmakologischen Wirkstoff) ohne Umverpackung und ohne Packungsbeilage. Die Packungsbeilage halten wir deshalb hier für Sie zum Download bereit. Bei einer Bestellung gilt folgendes: Sie bestellen und bezahlen, PillenPeter.com liefert ohne wenn und aber – diskret, schnell, versandkostenfrei direkt aus der EU (keine Zollprobleme)! Sie erhalten durch uns keinerlei medizinische oder pharmakologische Beratung. Grundsätzlich sollten Sie vor der Einnahme von Medikamenten, gleich welcher Art, mit einem Arzt sprechen. Er kann Ihre Situation am Besten beurteilen und Sie ggf. auf Risiken und Nutzen zu einer Behandlung mit Potenzmitteln hinweisen. Wir bieten Ihnen erstklassige Ware, ohne Wucherpreise, die Sie eventuell aus einer Apotheke (Versandapotheke) kennen. Innerhalb Ihres Zahlungsvorganges werden Sie darauf hingewiesen, dass Ihre Zahlung an ShopService24.Net (PillenPeter.com) oder an uns direkt erfolgt! Bewahren Sie Medikamente, insbesondere Potenzmittel, an einem für Kinder unzugänglichem Ort auf!

© [www.pillenpeter.com](http://www.pillenpeter.com)